

SO PFLEGEN SIE IHRE PROTHESE ODER TEILPROTHESE

Tägliche Pflege

Füllen Sie das Waschbecken vor der Reinigung unbedingt mit Wasser oder legen Sie ein weiches Handtuch darauf. Prothesen und Teilprothesen können brechen, wenn sie herunterfallen und auf eine harte Oberfläche treffen.

Spülen Sie die Prothese/Teilprothese nach jeder Mahlzeit unter warmem Wasser ab, um lose Speisereste zu entfernen. Kochendes oder zu heißes Wasser kann dazu führen, dass sich die Prothese verzieht und nicht mehr richtig sitzt.

Sie sollten täglich mit einer weichen Zahnbürste oder einer weichen Prothesenbürste geputzt werden.

Sie können mit warmem Wasser, Seife oder Prothesenpaste abgebürstet werden. Normale Zahnpasta ist zu abrasiv und kann Kratzer im Acryl verursachen.

Reinigungstabletten können verwendet werden, während die Prothese in Wasser eingeweicht wird. Diese helfen, leichte Flecken zu entfernen und Plaqueablagerungen zu lösen. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers; Jeder Typ/jede Marke ist anders.

Nach dem Einweichen gründlich unter warmem Wasser ausspülen, bevor es wieder in den Mund eingesetzt wird. Nach dem Spülen mit Wasser kann Mundwasser verwendet werden, um einen frischen Geschmack und ein frisches Gefühl zu erzielen.

Pflege von Mund- und Zahnfleischgewebe

Wenn Sie Ihre Prothese/Teilprothese nicht tragen, bewahren Sie sie immer in Wasser oder Prothesenlösung auf. Andernfalls trocknet das Acryl mit der Zeit aus, wodurch es nicht mehr so gut in Ihren Mund passt und spröde wird.

Es ist wichtig, die Prothese/Teilprothese abends vor dem Schlafengehen rauszunehmen, damit das Zahnfleisch atmen kann. Dies trägt dazu bei, Reizungen, Beschwerden und Infektionen des Weichgewebes unter Ihrer Prothese zu vermeiden.

Während sich die Prothese/Teilprothese außerhalb des Mundes befindet, reinigen Sie das Gewebe in Ihrem Mund mit einem angefeuchteten Waschlappen oder einer sehr weichen Zahnbürste mit warmem Wasser (oder einer Salzwasserlösung). Achten Sie darauf, die Zahnleisten (wo die Prothese sitzt), die Zunge, die Lippen, die Wangen und den Gaumen abzuwischen. Tägliches Spülen mit lauwarmem Salzwasser kann dabei helfen, Ihr Zahnfleisch sauber zu halten.

Wenn Sie eine Teilprothese tragen, empfiehlt es sich, zum Reinigen Ihrer natürlichen Zähne, anders als Ihre eigentliche Zahnbürste, eine weiche Zahnbürste zu verwenden.

Wenn der Mund wund oder gereizt wird

Wenn die Prothese/Teilprothese zu viel Druck auf einen bestimmten Punkt ausübt, können Wunde Stellen im Mund entstehen. Wunde Stellen können als kleine Markierung oder Wunde im Zahnfleischgewebe in Erscheinung kommen.

Wenn dies bei Ihnen auftritt, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen, damit er die richtigen Anpassungen vornehmen kann, um den Druck zu lindern.

Versuchen Sie niemals, Ihre Prothese/Teilprothese selbst anzupassen oder zu reparieren. Sie könnten sie leicht beschädigen und ihre Passform negativ beeinflussen.

Um Ihr Zahnfleisch zu beruhigen, sollten Sie Ihren Zahnersatz herausnehmen und Ihren Mund mit warmem Salzwasser ausspülen.

Obwohl es das Beste für Ihr Zahnfleischgewebe ist, Ihre Prothese/Teilprothese nicht mehr zu tragen, solange wunde Bereiche im Mund vorhanden sind, ist es für den Zahnarzt hilfreich, wenn Sie sie am Morgen Ihres Termins wieder einsetzen. Auf diese Weise kann der Zahnarzt die wunden Stellen in Ihrem Mund leichter erkennen und besser feststellen, welcher Bereich der Prothese/Teilprothese angepasst werden sollte.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Bleichmittel verwenden, um meine Prothesen aufzuhellen?

Die Antwort lautet nein. Das Bleichmittel wird den rosafarbenen Acrylanteil Ihrer Prothese aufhellen und diese beschädigen.

Muss meine Zahnprothese jemals ersetzt werden?

Höchstwahrscheinlich ja. Ihr Zahnfleischgewebe unterliegt einem ständigen Wandel und mit der Zeit kommt es zu Knochenverlust. Dadurch wird Ihr Zahnersatz locker und sitzt nicht mehr richtig. In diesem Fall können Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen, um die Zähne unterfüttern oder einen neuen Zahnersatz anfertigen zu lassen.

Was passiert, wenn sie kaputt gehen?

Versuchen Sie niemals, sie selbst zu reparieren. Bringen Sie sie zu Ihrem Zahnarzt, damit er sie an ein zahnmedizinisches Labor schicken kann. Möglicherweise müssen Sie während der Reparatur einige Tage darauf verzichten, da jeder Fall anders ist. Wenn Zähne locker werden oder abbrechen, können sie ersetzt werden.

VIELEN DANK!!

DASS SIE SICH FÜR TRUDENT CLINICS ENTSCHIEDEN HABEN