



VERZORGINGSINSTRUCTIES NA BEHANDELING VOOR TIJDELIJKE KRONEN

Als u onder verdoving bent behandeld kauw dan niets totdat de verdoofdheid voorbij is.

Vermijd kauwen gedurende minstens een uur.

Vermijd het eten van hard of kleverig voedsel zoals kauwgom en kauw indien mogelijk met de andere kant van uw mond.

Poets uw tanden zoals gewoonlijk, maar flos voorzichtig. Haal bij het flossen de flosdraad langs de zijkant van de tand of kies.

Als uw tanden gevoelig zijn voor warmte, kou of druk, gebruik dan een desensibiliserende tandpasta, maar als de gevoeligheid toeneemt of langer dan een paar dagen aanhoudt, neem dan contact op met onze praktijk.

Als de tijdelijke kroon loslaat, neem dan contact met ons op en bewaar hem zodat hij opnieuw kan worden bevestigd.

Het is belangrijk om de tijdelijke kroon op zijn plaats te houden om ervoor te zorgen dat de definitieve kroon goed past. Als u ongemak ervaart:

- Medicijnen, waaronder antibiotica, mogen alleen volgens voorschrift worden ingenomen.
- Spoel uw mond drie keer per dag met lauw water waaraan een theelepel zout is toegevoegd.

Bel ons als u niet goed kunt bijten, als u voortdurend pijn of ongemak ervaart of als u andere problemen hebt.

BEDANKT!

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN TRUDENT KLINIEKEN

VERZORGINGSINSTRUCTIES NA BEHANDELING VOOR TIJDELIJKE KRONEN