



IMPLANT CROWNS

Entretien de la restauration d'implants

Après la pose de l'implant par le chirurgien, il faut suivre ses instructions et communiquer sans délai toute anomalie au cabinet du chirurgien. Notre phase de restauration finale commencera aussitôt que le chirurgien nous aura donné son accord. Ce délai dure en général de 3 à 6 mois après la pose de l'implant. Si vous portez une prothèse provisoire de notre cabinet, veuillez nous appeler si vous avez des difficultés liées à celle-ci.

Restaurations sur implants fixes

Votre restauration est cimentée à un pilier qui est attaché à votre implant à l'aide d'une vis. Un soin minutieux a été accordé pour serrer correctement la vis afin d'éviter qu'elle ne se desserre. Il arrive, rarement, que ces vis se desserrent. Si vous croyez ressentir un déplacement de la dent, il est important de nous en avertir. Cela peut signifier que la vis de fixation est en train de se desserrer. Les vis desserrées risquent de se briser et peuvent être difficiles, voire impossibles, à retirer.

Si votre restauration est faite d'une seule couronne ou d'un bridge à plusieurs dents qui ne sortent pas de la bouche, suivez les instructions suivantes :

Il est également essentiel de se présenter aux examens dentaires de routine pour nous permettre d'inspecter la restauration de l'implant. Préservez le tissu gingival autour de l'implant en vous brossant les dents et en passant le fil dentaire. Si vous constatez un léger saignement ou une inflammation du tissu gingival, effectuez un rinçage à l'eau salée tiède 3 à 4 fois par jour. Si ce problème n'est pas réglé dans les 3 à 4 jours, contactez notre cabinet. Informez-nous sans délai de tout saignement excessif ou de tout gonflement autour de la zone de l'implant. **IL NE FAUT PAS UTILISER DE CURE-DENTS NI DE PIÈCES MÉTALLIQUES À PROXIMITÉ DE L'IMPLANT.** Cela risque de l'endommager gravement. Il existe des instruments sans danger pour les implants que nous pouvons recommander si vous avez besoin de produits de nettoyage supplémentaires. Les couronnes attachées sur vos implants nécessitent le même entretien qu'une couronne normale. Ne mâchez pas de glace, ce qui provoquerait une fracture de la porcelaine. Il faut faire très attention lorsque l'on mange des aliments très durs et ne pas tenter d'ouvrir ou de déchirer des objets avec les dents.

Veillez nous appeler si vous avez d'autres questions.

MERCI !

D'AVOIR CHOISI TRUDENT CLINICS