



TRUDENT KLINIEK KRONEN en BRUGGEN

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOOR BEHANDELING

KROON- EN BRUGPROTHESES

Ik erken en begrijp dat de behandeling van tandheelkundige aandoeningen waarvoor kronen en/of vaste bruggen nodig zijn, bepaalde risico's en mogelijk onsuccesvolle resultaten met zich meebrengt, waaronder de mogelijkheid van mislukking. Hoewel zorgvuldigheid en toewijding worden betracht bij de behandeling en vervaardiging van aandoeningen waarvoor kronen en bruggen nodig zijn, worden er geen beloften of garanties gedaan met betrekking tot de verwachte resultaten of hoe lang kronen en/of vaste bruggen zullen meegaan. Ik accepteer de risico's die verbonden zijn aan de kroon en/of vaste brug, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

1. Vermindering van de tandstructuur

Om rotte of anderszins getraumatiseerde tanden te vervangen door kronen en/of bruggen, moeten de bestaande tand of tanden worden aangepast. De tandvoorbereiding wordt zo conservatief mogelijk gedaan, maar ik begrijp dat normaal gesproken ten minste een deel van de structuur van de bestaande tand wordt verwijderd.

2. Gevoelloosheid na anesthesie

Voor de voorbereiding van tanden voor kronen of bruggen is meestal verdoving nodig. Het gebruik van injecties of verdoving kan soms leiden tot zwelling, gevoeligheid van de kaakspieren en vaak zelfs tijdelijke gevoelloosheid van de tong, lippen, tanden, kaken en/of gezichtsheffels; in zeldzame gevallen kan deze gevoelloosheid blijvend zijn.

3. Gevoeligheid van de tanden

Na het voorbereiden van de tanden op kronen of bruggen kan een lichte of ernstige gevoeligheid van de tanden optreden. Deze gevoeligheid kan kort duren of juist veel langer. Als het aanhoudt, moet u ons hiervan op de hoogte stellen zodat we de oorzaak van de gevoeligheid kunnen vaststellen en proberen het te behandelen.

4. Tand met een kroon of brug kunnen een wortelkanaalbehandeling nodig hebben. Een aandoening die bekend staat als pulpitis of pulpadegeneratie kan zich ontwikkelen nadat de tanden zijn gekroond. De tand(en) kan (kunnen) getraumatiseerd zijn door een ongeval, diep tandbederf, overmatige voorbereiding voor een kroon of brug of andere oorzaken. De aangetaste tanden kunnen een wortelkanaalbehandeling nodig hebben. Een wortelkanaalbehandeling kan nodig zijn als de tanden nog lange tijd gevoelig blijven nadat de kroon is geplaatst. In zeldzame gevallen kunnen de tand of tanden abcessen vertonen of op een andere manier niet genezen, waardoor een wortelkanaalbehandeling, een worteloperatie of mogelijk een tandextractie nodig kan zijn.

5. Breuk

Kronen en bruggen kunnen breken of afbrokkelen. Veel factoren kunnen hiertoe bijdragen, waaronder het kauwen op te harde materialen, veranderingen in de beetkracht, traumatische klappen in de mond, enz. Om deze redenen kunnen kronen onmerkbare barsten ontwikkelen, maar de kronen/bruggen zelf kunnen pas na verloop van tijd breken. Breuk of afbrokkelen door defect materiaal of een defecte constructie komt zelden voor. Als het gebeurt, gebeurt het meestal kort na de plaatsing.



TRUDENT

KLINIEKEN

ESTD 2022

1

6. Ongemakkelijk of vreemd gevoel

Kronen en bruggen zijn kunstmatig en voelen daarom anders aan dan natuurlijke tanden. De meeste patiënten wennen na verloop van tijd aan dit gevoel. In sommige uitzonderlijke gevallen kan spierpijn of gevoeligheid in het temporomandibulaire gewricht (TMJ) - het kaakgewricht - na het plaatsen van de prothese voor onbepaalde tijd aanhouden.

7. Esthetiek of uiterlijk

Patiënten krijgen de gelegenheid om het uiterlijk van de kronen of bruggen ter plekke te bekijken voordat ze definitief worden gecementeerd. Hoewel dit voldoende is, wordt dit meestal vastgelegd in het dossier van de patiënt met een door de patiënt geparafeerd document.

8. Lange levensduur van kronen en bruggen

Er zijn veel variabelen die bepalen hoe lang kronen en bruggen meegaan. Hiertoe behoren enkele van de in de vorige paragrafen genoemde factoren, zoals de algemene gezondheid van de patiënt, mondhygiëne, regelmatige tandheelkundige onderzoeken en voeding. Daarom kan er geen garantie worden gegeven of verondersteld met betrekking tot de levensduur van kronen of bruggen.

Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om contact op te nemen met de tandarts als zich onverwachte problemen voordoen. De patiënt dient alle instructies nauwgezet op te volgen, inclusief het maken van een afspraak en het bijwonen van alle afspraken. Als u niet op tijd aanwezig bent bij de cementeerafspraak, kan dit ertoe leiden dat de kroon/brug niet goed past en kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOOR BEHANDELING

Ik, _____ heb allerlei vragen kunnen stellen over de aard en het doel van de kroon- en/of brugbehandeling en heb naar tevredenheid antwoord gekregen op mijn vragen.

Ik accepteer vrijwillig alle risico's, inclusief de risico's die hierboven zijn opgesomd, en inclusief het risico van ernstige schade, indien aanwezig, die kan worden geassocieerd met elke fase van deze behandeling, in de verwachting van het bereiken van de gewenste resultaten, die al dan niet kunnen worden bereikt.



Door dit document te ondertekenen, inclusief de voorgeschreven en toegediende medicijnen en/of anesthetica die nodig worden geacht voor mijn behandeling, machtig ik Dr. _____ en/of zijn/haar assistenten om elke noodzakelijke en/of aanbevolen behandeling voor mijn tandheelkundige aandoeningen uit te voeren.

Tand Nr(s). _____

Handtekening van de patiënt/wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger _____ Datum _____

Naam indien ondertekend namens de patiënt _____

Verwantheid _____

BEDANKT!

**BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN
TRUDENT KLINIEKEN!**

TrUSmile Team